



CONCURSO PÚBLICO



Nome: _____



29 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 02

**PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES**

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova é de **3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**Prefeitura Municipal de Teutônia – RS
Concurso Público – 001/2023**



**29 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 02****CONHECIMENTOS GERAIS****TEXTO**

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais. A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.

Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo. Entre 2010 e 2018, foram registrados 14 surtos no Brasil, correspondendo a 56% dos 25 notificados nos últimos 50 anos.

Além de ser transmitido por via oral, o parasita *Toxoplasma gondii* é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta. [...] Nos bebês, a toxoplasmose congênita pode ser assintomática, além de provocar sintomas graves, como atraso no desenvolvimento, cegueira, hidrocefalia. Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado. [...]

Embora a maioria dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita sejam assintomáticos, os sinais da tríade clássica da doença – retinocoroidite, calcificação intracraniana e hidrocefalia – ocorrem em mais de 10% dos indivíduos desse grupo. Há outros casos também em que a doença se manifesta com sinais não específicos de infecção aguda, como convulsões, aumento do baço e fígado, febre, anemia, entre outros.

Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão. [...]

Mas não é apenas por causa do risco de infecção em bebês e pessoas imunossuprimidas que devemos ficar atentos a essa doença. A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta.

No Sul, diversos grupos de pesquisadores e médicos da região mostraram que a alta incidência de quadros oculares no Brasil tem relação com a circulação de genótipos atípicos de *Toxoplasma gondii*, sendo que nenhum deles é mais dominante do que os outros. [...]

Os problemas de visão ocorrem pela infecção do *Toxoplasma gondii* na região mais interna do olho conhecida como úvea posterior; especificamente, nos tecidos coróide e retina. A coróide é bastante vascularizada, importante para a nutrição dos fotorreceptores localizados na parte mais externa da retina. A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro. Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira. [...]

Um estudo publicado, em 2022, mostrou a importância da atenção à toxoplasmose ocular nos diagnósticos de uveítes posteriores. Após avaliar mais de 3 mil pacientes, os autores relataram que, atualmente, a toxoplasmose é a principal causa de retinocoroidite (inflamação da retina e da coróide), atingindo principalmente a população em idade mais produtiva, ou seja, inserida no mercado de trabalho. Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país.

Popularmente, a toxoplasmose é conhecida como a ‘doença do gato’. De forma equivocada, acredita-se que a transmissão da doença ocorra apenas através do contato da boca com as mãos contendo restos de fezes de gatos domésticos. A infecção ocorreria durante a limpeza das caixas de areia, onde se encontram as fezes contaminadas com o *Toxoplasma gondii*, na forma de oocistos. [...]

Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção. [...]

A OMS classifica a toxoplasmose como “doença transmitida por alimentos contaminados”, uma vez que a via oral é a principal rota de transmissão. Nesse caso, a infecção ocorre pelo consumo de água, frutas e verduras contaminadas com oocistos ou de carnes cruas ou mal passadas



(sobretudo, porcos, ovinos e bovinos) também contaminadas com cistos. [...]

Por conta da pressão do sistema imune para combater a infecção, o *Toxoplasma gondii* inicia o processo de ‘encistamento’ para se proteger. Durante esse processo, o parasita diminui o seu ritmo de replicação e permanece em estado ‘adormecido’ nos músculos, cérebro, coração e outros órgãos do hospedeiro, até ter condições de retornar à fase de multiplicação rápida e continuar sua disseminação pelo organismo, ou passar para outro animal que tenha ingerido partes do seu corpo contaminado. [...]

A transfusão de sangue, o transplante de órgãos e o compartilhamento de agulhas também são formas de transmissão dessa parasitose. Por isso, o controle de qualidade e da presença de *T. gondii*, principalmente em concentrado de linfócitos para determinadas transfusões, é fundamental. Esse parasito não infecta hemácias, mas pode infectar e ‘pegar carona’ em outras células do sangue.

Apesar de existir tratamento para a toxoplasmose, as medicações utilizadas são as mesmas descobertas na década de 1950, que têm ação apenas durante a fase aguda da doença, quando o parasito ainda não se transformou em cisto. O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos: sulfonamidas e derivados diaminopirimidínicos. Estes medicamentos são em sinergia à soma das ações de cada medicamento para inibir a síntese de folato.

Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido fólico. Entre os efeitos adversos, estão a anemia megaloblástica [...], reações de hipersensibilidade às sulfonamidas e necrose hepática. Por causa disso e do tratamento ser longo, ao menos 30% das pessoas deixam de se tratar. [...]

ARAÚJO, M. R. P. de; VOMMARO, R. C. *Toda a atenção para a toxoplasmose*. In: Revista Ciência Hoje [CH 397]. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/artigo/toda-a-atencao-para-a-toxoplasmose/>>. Último acesso em 12 de junho de 2023. (Adaptado)

Questão 01

“Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo”.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a expressão que substitui, sem

prejuízo semântico, o termo destacado no trecho acima.

- a) Nociva.
- b) Esquecida.
- c) Grave.
- d) Erradicada.
- e) Debelada.

Questão 02

“A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.”

Assinale a alternativa que apresenta o significado CORRETO do termo destacado no trecho acima.

- a) O que é usado para suprir danos, falhas.
- b) Aquilo que se sobressai em relação aos demais.
- c) O que está por completo, inteiro.
- d) Aquilo que se encontra por todo lugar.
- e) O que é eliminado por um período e reaparece.

Questão 03

Em “Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão”, os termos destacados devem ser classificados, respectivamente, como:

- a) Pronome indefinido, substantivo, preposição.
- b) Advérbio, adjetivo, advérbio.
- c) Numeral, substantivo, preposição.
- d) Pronome relativo, adjetivo, preposição.
- e) Pronome indefinido, adjetivo, advérbio.

Questão 04

“Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.”

Assinale a alternativa que reescreve CORRETAMENTE o trecho acima de acordo com a norma culta e as relações sintático-semânticas do período.

- a) Dentre os fatores pelos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação no qual o feto foi infectado.
- b) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação no qual o feto foi infectado.



- c) Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação que o feto foi infectado.
- d) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação onde o feto foi infectado.
- e) Dentre os fatores nos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.

Questão 05

A palavra “hipersensibilidade” é formada pelo mesmo processo de formação que em:

- a) Hospedeiro.
- b) Tratamento.
- c) Consumo.
- d) Assintomática.
- e) Infelizmente.

Questão 06

“A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta”.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o referente retomado pelo termo em destaque no trecho acima.

- a) “naquelas saudáveis”.
- b) “pessoas com problemas de visão”.
- c) “Pessoas”.
- d) Aquelas pessoas saudáveis.
- e) “A incidência de pessoas”.

Questão 07

No trecho “Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido fólico”, o trecho destacado exerce a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Adjunto adverbial.
- c) Objeto direto.
- d) Complemento nominal.
- e) Sujeito.

Questão 08

Em “A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro”, o termo oracional está devidamente classificado como:

- a) Complemento nominal.
- b) Agente da passiva.
- c) Adjunto adnominal.

- d) Predicativo do sujeito.
- e) Agente circunstancial.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo oracional com a função de objeto indireto.

- a) “Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais”.
- b) “Além de ser transmitido por via oral, o parasita Toxoplasma gondii é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta”.
- c) “Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país”.
- d) “Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção”.
- e) “O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos”.

Questão 10

“Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira.” A locução conjuntiva destacada no trecho introduz a noção de:

- a) Causa.
- b) Oposição.
- c) Condição.
- d) Consequência.
- e) Concessão.

Questão 11

Leia com atenção as afirmações:

- Todo gato é um animal.
- Todo animal tem quatro patas.

Pode-se concluir que:

- a) Todo animal é um gato.
- b) Todo gato tem uma pata.
- c) Nem todo animal é um gato.
- d) Nem todo gato é um animal.
- e) Todo gato tem quatro patas.

**Questão 12**

Na sequência decrescente a seguir: $2^n, 2^{n-1}, \dots, 2^{n-4}$ (n é um número natural), a mediana dos elementos dessa sequência é 8. Assinale a alternativa que representa o valor de “n”.

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Questão 13

Em uma pesquisa de opinião realizada com 50 pessoas, foram registrados os seguintes números de filhos por família: 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14.

Assinale a alternativa que representa a Moda desta distribuição.

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 3.

Questão 14

Junto a uma parede, com altura de 10 metros, pretende-se completar uma cerca retangular com 80 metros de perímetro. Assinale qual a área máxima possível.

- a) $800m^2$
- b) $650m^2$
- c) $500m^2$
- d) $400m^2$
- e) $250m^2$

Questão 15

O adicional por tempo de serviço é devido à razão de _____ por ano de serviço público prestado ao Município sob qualquer forma de contratação, incidente sobre o vencimento da classe ou padrão do servidor ocupante de cargo efetivo. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna, conforme Estatuto do Servidor Público do Município de Teutônia/RS.

- a) 1%.
- b) 2%.
- c) 0,5%.
- d) 3%.
- e) 1,5%.

Questão 16

Conforme a Lei nº 4.350/14, que institui o regime próprio de previdência social do município de

Teutônia/RS, são atribuições do Setor de Previdência Municipal, EXCETO.

- a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração do RPPS – CARPPS.
- b) Promover os reajustes dos benefícios na forma prevista em decreto e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
- c) Executar as atividades administrativas do RPPS.
- d) Submeter as contas anuais do RPPS à deliberação do CARPPS e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
- e) Praticar os atos referentes à inscrição de segurados ativos, inativos, dependentes e pensionistas, bem como sua exclusão.


Questão 17

Conforme Lei nº 4.350/14, as receitas decorrentes de investimentos e as patrimoniais são consideradas:

- a) Fontes de financiamento do plano padrão do regime próprio de previdência social.
- b) Fontes operacionais do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
- c) Fontes de financiamento do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
- d) Fontes secundárias do plano de atividade do regime próprio de previdência social.
- e) Fontes de financiamento de forma direta do plano padrão do regime próprio de previdência social.

Questão 18

Nos parques tecnológicos, é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que um usuário está em um computador com Windows 11 e a área de notificação apresenta-se como a imagem a seguir.





O usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longos períodos de trabalho.

Baseado no exposto acima, assinale a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado pelo usuário para realizar a configuração desejada.

- a) Modo Avião.
- b) Luz Noturna.
- c) Acessibilidade.
- d) Economia de Bateria.
- e) Bluetooth.

Questão 19

Caso o servidor público tenha extinguido o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração _____, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Integral ao tempo de serviço.
- b) Proporcional ao tempo de serviço.
- c) Reduzida, conforme tempo de serviço.
- d) Proporcional ao tempo da disponibilidade.
- e) Reduzida, conforme tempo da disponibilidade.

Questão 20

São símbolos da República Federativa do Brasil, EXCETO:

- a) Palácio do Planalto.
- b) Selo nacional.
- c) Armas.
- d) Hino.
- e) Bandeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

O propósito ou meta de humanizar, em todos os sentidos apontados, mais objetivamente no caso da saúde, implica aceitar e reconhecer que nessa área e nas suas práticas, em especial, subsistem sérios problemas e carências de muitas das condições exigidas pela definição da concepção, organização e implementação do cuidado da saúde da humanidade, tanto por parte dos organismos e práticas estatais, como da sociedade civil. Sobre o tema, analise os itens abaixo:

I- Se tivesse que resumir a missão de humanização num sentido amplo, além da melhora do tratamento

intersubjetivo, dir-se-ia que se trata de incentivar, por todos os meios possíveis, a união e colaboração interdisciplinar de todos os envolvidos.

- II- Humanizar é apenas “amenizar” a convivência hospitalar, buscando tão somente diminuir a dor e o desconforto dos pacientes.
- III- humanizar a assistência em saúde implica dar lugar tanto à palavra do usuário quanto à palavra dos profissionais da saúde, de forma que possam fazer parte de uma rede de diálogo, que pense e promova as ações, campanhas, programas e políticas assistenciais a partir da dignidade ética da palavra, do respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade.
- IV- O contato direto com seres humanos coloca o profissional diante de sua própria vida, saúde ou doença, dos próprios conflitos e frustrações. Se ele não tomar contato com esses fenômenos correrá o risco de desenvolver mecanismos rígidos de defesa, que podem prejudicá-lo tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item II está incorreto.
- b) Apenas o item III está incorreto.
- c) Apenas o item IV está incorreto.
- d) Apenas os itens II e IV estão incorretos.
- e) Apenas o item I está incorreto.

Questão 22

Segundo a resolução COFEN 311/2007, em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O profissional pode administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga, desde que esteja prescrito.
- b) O técnico de enfermagem pode prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, desde que tenha embasamento científico para isso.
- c) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- d) O profissional de enfermagem pode assinar as ações de enfermagem que não executou, desde que esteja ciente de que a medicação foi administrada.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 23

O técnico de enfermagem deve estar preparado para atender vítimas de queimaduras de todas as idades, visto que esse tipo de acidente atinge todas as faixas etárias e todas as camadas sociais. Lesões decorrentes de queimaduras são causas importantes de morbidade e mortalidade. São causadas por diferentes agentes, nos



diferentes ambientes e em situações acidentais ou provocadas, como suicídio e violência. Analise as assertivas abaixo e assinale, em seguida, a alternativa que apresenta as CORRETAS:

- I- É preciso classificar as queimaduras de acordo com a profundidade do tecido lesado e extensão da lesão, com a finalidade de orientar os cuidados a serem prestados. As lesões de primeiro grau provocam eritema, dor local e formam bolhas, atingindo a epiderme e parte da derme. As de segundo grau atingem derme e epiderme, com formação de bolhas, eritema e sem formação de bolhas. As de terceiro grau atingem epiderme, derme e músculos e as lesões são secas, vermelhas e com a presença de muitas bolhas.
- II- O paciente Pequeno Queimado tem comprometimento de até 10% da superfície corporal; o Médio Queimado tem lesões em até 20% de sua superfície corporal; já o Grande Queimado apresenta lesões em mais de 20% de sua superfície corporal (em adultos).
- III- No atendimento da vítima de queimaduras, é necessário seguir as etapas do ABCDE, segundo o Advanced Trauma Life Support Course (ATLS, 2008), ao mesmo tempo identificando lesões que coloquem a vítima de risco de vida ou em situações incapacitantes. A este atendimento deve ser acrescentada a observação de algumas particularidades relacionadas ao paciente queimado que poderão auxiliar na escolha e/ou indicação do tratamento.
- IV- A limpeza das lesões de queimadura deve ser realizada no atendimento inicial, sendo feita com sabão e solução fisiológica. Não se deve retirar nenhuma parte do tecido desvitalizado ou necrosado, mesmo que sejam facilmente removíveis. A lesão não deve ser ocluída.
- V- Em casos de queimaduras de terceiro grau o paciente deve ser encaminhado imediatamente a um centro especializado, após estabilização. A temperatura do ambiente deve ficar em torno de 42°C, devido à impossibilidade de se usar mantas para prevenir a hipotermia.
- VI- São dois os fatores que influenciam a gravidade de lesões de queimaduras químicas: a concentração do produto e a duração do contato. Essas informações devem ser obtidas no atendimento pré-hospitalar e os profissionais devem ter cuidado com sua proteção do contato com a substância.
- VII- No caso de queimaduras elétricas, o técnico deve ficar atento quanto aos parâmetros vitais, estabelecendo a monitorização cardíaca e providenciando acesso venoso o menos calibroso

possível, para não traumatizar ainda mais a vítima. Esta não deve receber quantidades grandes de líquido.

- a) I, II, III, VI.
- b) II, III, V, VII.
- c) II, III, V.
- d) I, IV, VI.
- e) II, III, V, VII.

Questão 24

Sobre a angina do peito, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na angina variante, o paciente tem alterações eletrocardiográficas, mas não refere nenhuma dor.
- b) A angina instável tem melhora do quadro à medida em que o paciente repousa e faz uso de nitroglicerina.
- c) Administrar a prescrição de nitroglicerina prescrita, sempre por via endovenosa.
- d) Angina de peito é uma síndrome clínica de desconforto ou pressão precordial decorrente de isquemia miocárdica transitória com infarto.
- e) O paciente deve ser orientado a interromper as atividades e sentar-se ou repousar no leito na posição de semi-Fowler, desse modo, reduzindo as necessidades de oxigênio do miocárdio isquêmico.

Questão 25

Leia o enunciado e responda:

É um óleo vegetal e protege a ferida preservando o tecido vitalizado, mantendo úmido o meio e evitando a aderência ao leito da lesão. O enunciado trata de:

- a) Óleo de coco.
- b) Ácido graxo essencial.
- c) Hidrocoloide.
- d) Óleo de copaíba.
- e) Óleo de jojoba.

Questão 26

A necrose do tecido provocada pela dificuldade de circulação nas regiões pressionadas, em razão do tempo em que o paciente está acamado, é denominado de:

- a) Feridas.
- b) Escaras.
- c) Lesões.
- d) Distúrbios.
- e) Queloides.

Questão 27

A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa. Prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. Acerca deste assunto, analise as alternativas marcando V para verdadeiro ou F para falso e, a seguir, assinale a alternativa CORRETA.



- () O intervalo entre as doses de vacina do HPV não deve ser superior a 12-15 meses, para que o esquema vacinal seja completado o mais prontamente, visando garantir uma elevada produção de anticorpos e a efetividade da vacinação.
- () A vacina pentavalente será contraindicada quando houver quadro neurológico em atividade e/ou após administração da vacina.
- () A vacina BCG deverá ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida.
- () A vacina contra Hepatite B deverá ser administrada na dose de 0,5ml em indivíduos de até 19 anos de idade, e 1,0ml a partir de 20 anos de idade.

- a) V-V-V-F. b) F-F-F-V.
c) F-F-F-F. d) V-V-V-V.
e) F-V-V-F.

Questão 28

O Decreto nº 94.406/87 regulamentava a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências. Em seu art. 10, trata sobre o exercício do técnico de enfermagem, que deve assistir o enfermeiro em ações como:

- I- No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.
- II- Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.
- III- Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os itens I, II e III são verdadeiros.
b) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
c) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
d) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
e) Apenas o item I é verdadeiro.

Questão 29

Tomando como base o calendário de vacinação para 2018, numere a coluna B de acordo com a Coluna A:

Coluna A

- I- Meningocócica C.
II- Pentavalente.
III- Pneumocócica 10 Valente.

Coluna B

- () Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB.

- () Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo.
() Previne contra doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) II – III – I.
b) I – II – III.
c) III – II – I.
d) I – III – II.
e) II – I – III.

Questão 30

O Técnico de Enfermagem recebeu a seguinte prescrição: Administrar 500 ml de soro fisiológico a 0,9% em 30 minutos. Assinale quantas gotas deverão correr por minuto.

- a) 6 gotas/minuto.
b) 12 gotas/ minuto.
c) 30 gotas/ minuto.
d) 333 gotas/minuto.
e) 999 gotas/ minuto.

Questão 31

A via de administração intramuscular é muito utilizada por conta de sua rápida velocidade de absorção. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao volume máximo que se deve administrar por esta via, especificamente na região do músculo deltoide em um adulto:

- a) 2 ml. b) 3 ml.
c) 4 ml. d) 5 ml.
e) 6 ml.

Questão 32

Uma das formas de se minimizar os riscos de contaminação é através da divisão das áreas pela classificação do risco de contaminação. Com relação à classificação das áreas pelo risco de contaminação, analise os itens abaixo:

- () Áreas não críticas são todas as áreas hospitalares não ocupadas por pacientes, como, por exemplo: escritórios e depósitos.
() São exemplos de áreas semicríticas: laboratório de análises clínicas, banco de sangue e sala de hemodiálise.
() Áreas contaminadas são aquelas em que se verifica a presença de sangue, pus e secreções ou excreções.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V-V-V. b) F-F-F.



- c) F-V-F.
e) V-F-V.

- d) V-F-F.

Questão 33

A assistência de enfermagem tem papel fundamental durante a coleta de exames laboratoriais. A respeito da assistência de enfermagem durante a coleta do hemograma, analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I- A assistência de enfermagem engloba a instrução do paciente quanto ao preparo para a realização do hemograma.
II- A punção e o manuseio do garrote não interferem na distribuição de alguns constituintes do sangue.
III- Deve-se realizar a identificação correta dos tubos de coleta e a assepsia do local da punção após a palpação.

- a) I, II e III estão corretos. b) I e III estão corretos.
c) Apenas II é correto. d) Apenas III é correto.
e) II e III estão corretos.

Questão 34

A síncope é a perda súbita da consciência, que pode ser de curta duração, que não necessite de intervenções específicas para recuperação do paciente. Ocorre devido à diminuição da atividade cerebral. Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito às síncopes e como socorrer a vítima nesse caso:

- a) A síncope vasogênica é causada por distúrbios metabólicos como hiperglicemia ou hipoglicemia. A vítima apresenta palidez cutânea, respiração suspirosa, queixa de visão embaçada, tontura e em seguida ocorre o desmaio. A neurogênica ocorre pela súbita queda da pressão arterial.
b) No atendimento pré-hospitalar, deve-se evitar conversar com a vítima, pois ela está confusa e pode não responder aos questionamentos de forma adequada.
c) A vítima deve ser mantida deitada, com a cabeça abaixo do ombro. Deve ter os sinais vitais verificados e fazer um teste de glicemia; se for necessário, administrar oxigênio sob orientação médica. Os curiosos devem ser mantidos longe e não se pode dar água ou nenhum outro tipo de líquido antes da vítima estar totalmente acordada.
d) Quando não se trata de trauma, a dificuldade do socorrista em identificar a causa é menor; a pessoa deve ser mantida com a cabeça no mesmo nível do resto do corpo.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

Questão 35

O choque é uma condição em que o sistema cardiovascular fica impossibilitado de manter a perfusão tecidual adequada, por vários motivos. Quando há demora no reconhecimento e tratamento, ocorre mais rapidamente a falência de múltiplos órgãos e óbito. Assim, para que as ações ajudem na identificação precoce do choque em situações de urgência e emergência, é importante a compreensão de como se dá esse fenômeno, entendendo sua classificação, fisiopatologia, tratamento e cuidados de enfermagem. Assinale a alternativa INCORRETA relacionada ao tema:

- a) No atendimento pré-hospitalar em situações de trauma é importante que o técnico identifique sinais de choque hipovolêmico.
b) No atendimento pré-hospitalar em situações de trauma, pode ser percebida a alteração do nível de consciência, seguida de confusão mental e a vítima se torna irresponsiva devido à deterioração da perfusão cerebral.
c) Quando há hemorragias, os mecanismos compensatórios ativam o sistema nervoso central, promovendo a diminuição da frequência cardíaca e respiratória e a vasodilatação periférica.
d) No atendimento inicial ao paciente vítima de choque hipovolêmico, em eventos traumáticos, todos os esforços são voltados para a identificação da lesão responsável pelo choque. A prioridade é estabelecer o quadro hemodinâmico do paciente, infundindo soluções aquecidas isotônicas e avaliando a resposta da vítima ao tratamento.
e) São respostas da vítima na avaliação do tratamento para o choque hipovolêmico: resposta rápida, quando os parâmetros vitais melhoram e a vítima perdeu menos de 20% do volume sanguíneo; resposta transitória, quando apresenta melhora dos parâmetros vitais e volta a piorar hemodinamicamente, com perda de 20 a 40% da volemia e resposta mínima ou ausente, quando a vítima não apresenta melhora na fase de reanimação com reposição de solução isotônica.

Questão 36

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. É importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças renais e cardiovasculares maiores. A emergência hipertensiva requer redução rápida da pressão arterial e representa risco imediato à vida.

Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à crise hipertensiva.



- a) Um dos maiores riscos da crise hipertensiva são lesões a órgãos alvo, como tireoide, fígado, baço e coração. Quando a diastólica é menor do que 130mmHg e maior do que 100mmHg, há a necessidade de intervenção rápida.
- b) São algumas condições que podem desencadear a crise hipertensiva: edema agudo de pulmão, uremia, hemorragia cerebral, encefalites, epilepsia, ansiedade com hiperventilação, ingestão excessiva de drogas, dissecação de aorta, infarto agudo do miocárdio.
- c) O princípio para o tratamento da crise hipertensiva difere na urgência e na emergência. O principal objetivo é fazer com que as lesões dos órgãos alvo sejam reversíveis.
- d) Nas emergências hipertensivas são utilizadas drogas por via endovenosa, de ação rápida a fim de se reduzir logo a pressão arterial.
- e) Nas emergências hipertensivas são utilizadas drogas por via endovenosa, de ação rápida a fim de evitar lesões em órgãos alvo.

Questão 37

De acordo com a ANVISA, a higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Sobre o processo de higienização das mãos, julgue as assertivas atribuindo V para o item verdadeiro e F para o item falso.

- () A higienização apropriada das mãos com preparação alcoólica (sob as formas gel, solução, espuma e outras) não é apropriada, mesmo quando elas não estiverem visivelmente sujas.
- () A técnica de higienização simples das mãos com água e sabão requer tempo de duração do procedimento de 40 a 60 segundos.
- () Deve-se incentivar o uso coletivo de toalhas de tecido, pois estas impedem a proliferação bacteriana.

Julgadas as assertivas, assinale a alternativa que agrupa a sequência CORRETA.

- a) V-V-V. b) V-F-F.
c) F-V-F. d) F-F-V.
e) F-V-V.

Questão 38

Foram prescritos 500 ml de soro glicosado a 10 %. Na unidade de saúde os profissionais só dispõem de 500 ml de soro glicosado 5% e ampolas de 20ml de glicose 50%. A quantidade em ml da ampola de glicose que deve ser adicionada é de:

- a) 20 ml. b) 25 ml.
c) 30 ml. d) 40 ml.
e) 50 ml.

Questão 39

Um paciente, 42 anos, sexo masculino, deu entrada na emergência de um hospital de grande porte após ingestão de grandes quantidades de Haloperidol. Assinale qual medicamento/antídoto deve ser utilizado nesta situação.

- a) Pralidoxima. b) Sulfato Ferroso.
c) Biperideno. d) Naloxona.
e) Noripurum.

Questão 40

Sobre a classificação de Hipertensão estágio 3, da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos de idade, é CORRETO afirmar:

- a) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica entre 160 – 179 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica entre 100 - 109 mmHg.
- b) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica ≤ 120 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica ≤ 80 mmHg.
- c) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica entre 140 – 159 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica entre 90 – 99 mmHg.
- d) Todas as alternativas estão incorretas.
- e) É considerada Hipertensão estágio 3 se pressão arterial sistólica ≥ 180 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 110 mmHg.