

Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP
Concurso Público - 2017



Cod.25: MÉDICO ESF

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MODELO: 1

CADERNO DE QUESTÕES

TURNO: MANHÃ

NÚMERO DE QUESTÕES: 50

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.



MÉDICO ESF

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- A diferença de desempenho escolar entre as escolas públicas mais pobres e mais ricas no Brasil aumentou desde 2005. É o que mostra a comparação do NSE (Nível Socioeconômico), índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil, avaliação oficial do governo federal para medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática a cada dois anos.
- 5 O NSE é calculado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com base em dados de escolaridade, ocupação e renda fornecidos para a avaliação. Em 2005, a diferença de desempenho na prova entre os 20% com nível socioeconômico mais baixo e os 20% de nível mais alto para o 5º ano em Língua Portuguesa foi de 20,34 pontos. Em
- 10 2013 foi de 42,7 pontos, um salto de 110%. A desigualdade também cresceu no 9º ano, mas em menor proporção. Em 2005, a diferença entre a média das escolas de nível socioeconômico mais baixo e mais alto para Português foi de 24,39 pontos. Em 2013, subiu para 27,77, um salto de 14%.
- 15 Apesar disso, tanto o nível mais baixo quanto o mais alto tiveram notas aquém do esperado. O movimento Todos pela Educação considera que, nos anos iniciais, os estudantes deveriam ter obtido, no mínimo, 200 pontos em Língua Portuguesa e 225 em Matemática – as notas ficaram entre 182 e 205 pontos. Nos finais, as notas mínimas deveriam ter sido 275 pontos em Português e 300 em Matemática, mas alcançaram 237 e 242, respectivamente.
- 20 A redução desta diferença precisará estar no topo das prioridades do Ministério da Educação, de Estados e municípios nos próximos anos. É o que prevê o novo PNE (Plano Nacional de Educação). Faltam, no entanto, estratégias concretas para isso. Desde que o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assumiu a pasta, em setembro, o MEC tem afirmado que vai alterar os programas que atendem unidades mais carentes.
- 25 Os dados da Prova Brasil ainda mostram que o aumento na diferença das notas ocorre principalmente pela dificuldade de as escolas com alunos mais pobres progredirem. No 5º ano, a nota de Português da faixa de NSE mais baixo praticamente não variou de 2005 a 2013. Já os alunos de NSE mais alto variaram 12%.

(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões)

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos praticamente dobrou de 2005 para 2013.
- As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova.
- O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática.

a) V - V - F. b) F - V - V. c) F - V - F. d) V - F - F.

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é:

- a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres.
- b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no país.

c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes.

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de diferentes realidades socioeconômicas.

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA:

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva.

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) é desigualdade.

III. O texto está em desacordo com a norma culta.

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja alteração de sentido na frase.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas II e IV estão corretas.

d) Apenas II e III estão corretas.

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto:

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L.

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em hiato.

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos proparoxítonos.

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E.

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas pelo processo de:

a) Derivação sufixal – composição.

b) Aglutinação - derivação sufixal.

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.

d) Derivação prefixal – composição.

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as questões de 06 a 09.

Tão velho estou como árvore no inverno,
vulcão sufocado, pássaro sonolento.
Tão velho estou, de pálpebras baixas,
acostumado apenas ao som das músicas,
à forma das letras.

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético
dos provisórios dias do mundo:
Mas há um sol eterno, eterno e brando
e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:
já não é a minha, mas a do tempo,
com seus muitos episódios.

Desculpai-me não ser bem eu:
mas um fantasma de tudo.
Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,
com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:
que os destroços, mesmo os da maior glória,
são na verdade só destroços, destroços.

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz das lâmpadas”.

a) Pronome oblíquo. **b) Objeto direto.** c) Agente da passiva. d) Pronome reflexivo.

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente em:

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo.

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços.

c) Fere-me a luz das lâmpadas.

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando.

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente no poema de Cecília Meireles acima.

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar no colo.

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.

**c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/
Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, naufraga da Vida, ando a morrer!**

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acorada ao pé do borralho, /olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, / tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na minha vida – / a vida mera das obscuras.

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em “Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.”.

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos portam, que constituem um aspecto negativo.

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico.

- c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o enunciador receberá muitos mil anos.
d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas.

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.”

- a) Aliteração. **b) Gradação.** c) Escala. d) Zeugma.

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa máquina?

- a) 2 grãos de café/segundo.**
b) 10 grãos de café/segundo.
c) 5 grãos de café/minuto.
d) 15 grãos de café/minuto.

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 colares?

- a) 2 horas.
b) 1,5 horas.
c) 2,5 horas.
d) 3 horas.

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede?

- a) DNS. b) ISO. c) **TCP/IP.** d) FTP.

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas:

- a) Tecla Windows+N. **b) Tecla Windows+M.**
c) Alt+F4. d) Alt+M.

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla:

- a) Insert. b) Enter. c) End. **d) Backspace.**

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de:

- a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.
d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas hipóteses:

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos).

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado. Marque o item que **NÃO** corresponde a um dos fundamentos dessa proposta.

- a) Democratização do acesso.
- b) Transparência no uso de recursos e ações do governo.
- c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado.**
- d) Interdisciplinaridade nas ações.

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8.080/90.

- a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos.
- b) Direito a informação sobre sua saúde.
- c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência.**
- d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades.

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _____ dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua _____ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa _____ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO.

- a) Ao Poder público, elaboração, física.
- b) Ao Estado, execução, somente jurídica.
- c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica.**
- d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa **INCORRETA** que não corresponde as legislações atuais do Sistema Único de Saúde.

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada:

- a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem ser comercializadas por profissionais liberais.
- b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.**
- c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS, na hipótese do art. 24.
- d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as normas de direito público.

25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) chamado(a):

- a) **Rede de Atenção à saúde.**
- b) Região de saúde.
- c) Mapa de saúde.
- d) Serviços especiais de acesso aberto.

26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, ações e serviços de, EXCETO:

- a) Atenção primária.
- b) Atenção secundária.
- c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- d) **Urgência e emergência.**

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído recentemente pela Lei 12.864 de 2013.

- a) Trabalho.
- b) **Atividade física.**
- c) Acesso aos bens e serviços.
- d) Lazer.

28. Claudia, de 6 meses de idade, apresenta há 3 dias febre de 38,5°C que chega a 39°C, coriza abundante com secreção amarelada, tosse seca, irritativa e leve queda do estado geral. No exame físico: orofaringe difusamente hiperemiada, membranas timpânicas hiperemiadas e levemente opacas. Assinale a opção que representa o diagnóstico e tratamento CORRETO:

- a) Faringoamigdalite bacteriana / Penicilina benzatínica dose única.
- b) Otite média aguda / amoxicilina por 10 dias.
- c) **Resfriado comum / soro fisiológico, antipirético e aumento de consumo hídrico.**
- d) Resfriado comum / expectorante, antipirético e anti-inflamatório não hormonal.

29. Paciente feminina procura atendimento com dor súbita, tipo cólica, localizada no flanco direito. Com história de repetição do quadro pela presença de litíase renal. A dor associada a obstrução do trato urinário aguda é resultado de:

- a) Prostaglandinas.
- b) **Distensão do sistema coletor ou capsula renal.**
- c) Aumento do fluxo sanguíneo renal.
- d) Natriurese compensatória.

30. Procura consulta no PSF, paciente masculino com histórias de cólicas nefríticas há vários meses. Com diagnóstico de litíase renal hipercalcêmica. Além do aumento da ingestão de líquidos, qual seria a recomendação dietética adequada para a prevenção de formação de novos cálculos?

- a) Dieta restrita em cálcio, proteína e sódio.
- b) Dieta restrita em cálcio, oxalato, proteína e sódio.
- c) Dieta com conteúdo normal de cálcio, mas restrita em proteína e sódio.**
- d) Dieta com conteúdo normal de cálcio, sódio e proteína.

31. Uma senhora com 39 anos de idade é atendida na Unidade Básica de Saúde com queixa de aumento de volume no pescoço há 6 meses. O médico encontrou um nódulo de mais ou menos 30 mm, de consistência endurecida e aderida aos planos profundos na palpação da região cervical. As dosagens séricas de T3, T4 e TSH foram normais. A ultrassonografia cervical evidenciou nódulo tireoidiano de 4,6 cm, com hipocogenicidade, microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares e fluxo intranodular. Assinale a opção que representa a principal hipótese diagnóstica e a investigação inicial a ser feita:

- a) Bócio nodular tóxico / biópsia excisional.
- b) Cisto do conduto tireoglosso / biópsia excisional.
- c) Tireoidite de Hashimoto / cintilografia tireoidiana.
- d) Carcinoma de tireoide / biópsia por agulha fina guiada por ultrassom.**

32. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por leptospiras patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria. É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves. A insuficiência renal aguda é uma importante complicação da fase tardia da doença e se caracteriza geralmente por apresentar as seguintes características renais:

- a) Glomerulonefrite difusa aguda, oligúria e hipercalemia.
- b) Hipernatremia hipertônica e oligúria.
- c) Inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e consequente perda de potássio.**
- d) Há menor produção de amônia e o H⁺ deixa de ser excretado e conseqüentemente o bicarbonato deixa de ser absorvido. Na falta de bicarbonato, o rim passa a aumentar a absorção de cloretos para compensar a carência de cargas negativas.

33. Dentre doenças infecciosas existentes causadas por bactérias temos as seguintes:

- a) Doença de Lyme, Botulismo, Brucelose e linfogranuloma venéreo.**
- b) Na malária, o período toxêmico ocorre mesmo que o paciente receba terapêutica específica, adequada e oportuna.
- c) A Meningite Tuberculosa não é transmissível, a não ser que esteja associada à Tuberculose pulmonar bacilífera, cuja transmissibilidade se mantém enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento.
- d) O diagnóstico laboratorial mais usado para detecção do sarampo é o RIFI, para detecção de anticorpos específicos IgM e IgG.

34. Na consulta de Pré-natal é recebida uma paciente de 23 anos com TG: 13 semanas para iniciar acompanhamento. Quando apresenta o cartão de vacinação constata-se só uma dose de dT (Tétano/Difteria). Assinale a conduta adequada:

- a) Não é necessário vacinar.
- b) Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível, independentemente da idade gestacional, com três doses, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias.
- c) Completar as três doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias.**
- d) Tomar uma dose de reforço.

35. Uma médica para concluir sua especialização em Saúde da Família decidiu realizar um projeto de intervenção comunitária para elevar o nível de conhecimento dos adolescentes da sua Unidade de Saúde sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ela irá fazer uma entrevista estruturada para avaliar o nível de conhecimento dos adolescentes sobre o tema. De acordo com o Código de Ética Médica qual é o procedimento adequado para realizar a pesquisa?

- a) O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) não necessita emitir parecer sobre o protocolo, pois a pesquisa tem apenas objetivos educacionais.
- b) Obter o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) assinado pelos adolescentes.
- c) Obter TCLE assinado pelos adolescentes e seus representantes legais e comunicar à comunidade sobre a natureza da investigação.**
- d) Realizar a entrevista na presença dos pais ou seus representantes legais.

36. A presença de proteinúria é um achado indicativo de comprometimento renal. Está presente no estágio inicial da doença renal antes de o comprometimento da função poder ser detectado. A perda de função renal é diretamente relacionada à quantidade de proteinúria e, quando associada à hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, agrava o prognóstico da doença renal. Atualmente, tem sido também apontada como possível biomarcador de doença cardiovascular. Logo, de acordo com a doença citada em questão e o aparelho genito-urinário, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Em indivíduos normais, proteínas de baixo peso molecular e uma pequena quantidade de albumina são filtradas pelo glomérulo e são totalmente reabsorvidas no túbulo contornado proximal.
- b) Em indivíduos normais algumas proteínas (incluindo a albumina) podem ser excretadas em pequenas quantidades na urina e não são detectadas pelo exame de urina simples de fita (EAS/urina tipo I), mas apenas por métodos cromatográficos.
- c) Pacientes portadores de diabetes mellitus (DM) apresentam a macroalbuminúria como principal marcador de risco cardiovascular. Apresentam principalmente excreção de albumina na faixa de 300-600mg/dia.**
- d) Uma vez identificada a presença de proteinúria no exame de fita, preconiza-se a dosagem em amostra de urina. Essa avaliação é realizada por meio da relação proteína (mg)/creatinina (g), que apresenta uma excelente correlação com a proteinúria medida em urina de 24 horas. A primeira urina da manhã é a mais indicada, no entanto o exame pode ser realizado em qualquer amostra.

37. O HPV (Vírus do Papiloma Humano) é um vírus capaz de infectar a pele e algumas mucosas, podendo originar o aparecimento de lesões - verrugas. Quando se localizam nos órgãos genitais, chamam-se condilomas acuminados ou verrugas genitais. Atualmente a infecção HPV é a infecção de transmissão sexual mais frequente. Logo, de acordo com o tema em questão analise as afirmativas abaixo e marque o item CORRETO:

- I- A maioria das infecções pelo HPV são transitórias (curam por si).
- II- O diagnóstico desta infecção tem especial importância na mulher, devido à possibilidade de associação do HPV a doença maligna do colo do útero.
- III- Esta infecção está também associada ao cancro anal em ambos os sexos.
- IV- O diagnóstico dos condilomas acuminados ou verrugas genitais baseia-se principalmente pelo exame citológico.

- a) Apenas o item III está correto.
- b) Apenas os itens II e III estão corretos.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.**

38. De acordo com a Síndrome Mielodisplásica marque a alternativa CORRETA:

- a) O tratamento habitualmente empregado para as SMD é o de apoio e inclui transfusões de hemácias ou plaquetas para controlar a anemia ou sangramento.**
- b) O tratamento de quimioterápicos deve ser iniciado antes da doença se tornar agressiva. E envolve o uso de quimioterápicos padrão como o ara-C, idarrubicina, daunorrubicina, 6-tioguanina ou mitoxantrone.
- c) As terapias que usam vitamina B e vitamina C são conhecidas como "agentes diferenciadores" porque estimulam as células imaturas a completarem todos os estágios do crescimento.
- d) O transplante de medula óssea (TMO) é o tratamento indicado somente para pacientes abaixo de 50 anos.

39. O esquema de administração da vacina contra a raiva de uso humano é diferenciado para a pós-exposição, para a reexposição e para a preexposição, conforme estabelecido em publicação editada pelo Ministério da Saúde: Norma Técnica de Tratamento Profilático Anti-Rábico Humano. Na pós-exposição, ou seja, na administração da vacina após contato com o vírus da raiva, o esquema depende da natureza da agressão e das condições do animal agressor. Logo, em um caso em que o paciente relata que foi mordido na mão por um cão de rua, aparentemente raivoso e suspeito para o vírus da raiva deverá receber o seguinte protocolo vacinal anti-rábico:

- a) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 7 doses. Mais duas doses de reforço, sendo a 1ª no 10º dia e a 2ª no 20º dia após a última dose da série.
- b) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 7 doses. Mais três doses de reforço, no 10º, no 20º e no 30º dia após a última dose da série.
- c) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 10 doses. Mais duas doses de reforço, sendo a 1ª no 10º dia e a 2ª no 20º dia após a última dose da série.
- d) Uma dose diária de vacina até completar uma série de 10 doses. Mais três doses de reforço, no 10º, no 20º e no 30º dia após a última dose da série.**

40. Em uma consulta obstétrica (pré-natal) de rotina uma paciente com 22 semanas de gestação, de 32 anos de idade relata que sempre teve contatos com gatos em sua residência. Ela questiona quais as possíveis formas do seu bebê adquirir toxoplasmose, pois teme muito pela saúde do mesmo.

De antemão, o médico deverá apresentar as seguintes alternativas de transmissão para o bebê, EXCETO:

a) Contato direto do bebê com os gatos (dentro do berço).

b) Ingestão de leite cru de vaca e cabra contaminadas durante o período de gestação.

c) Ingestão de leite pela mãe infectada no período de lactação.

d) Via transplacentária pela mãe infectante durante o período de gestação.

41. A hanseníase manifesta-se através de lesões de pele que se apresentam com diminuição ou ausência de sensibilidade. Dentre as lesões mais comuns da doença temos o nódulo que está caracterizado por apresentar a(s) seguinte(s) característica(s):

a) Ausência, diminuição ou aumento de melanina ou depósito de outros pigmentos ou substâncias na pele.

b) Pápula que evolui deixando cicatriz.

c) Processo patológico que se localiza na epiderme, derme e/ou hipoderme. Pode ser lesão mais palpável que visível.

d) Se estende em superfície por vários centímetros. Pode ser individual ou constituir aglomerado.

42. A cetoacidose diabética ocorre quase exclusivamente no diabetes tipo 1 e é o resultado de:

a) Deficiência acentuada de insulina associada a aumento absolutos ou relativos do glucagon.

b) Deficiência acentuada de insulina associada a redução absolutos ou relativos do glucagon.

c) Deficiência de insulina com aumento das reservas adiposas resultando na redução dos níveis de ácidos graxos livres.

d) Aumento do glucagon e redução dos níveis de ácidos graxos insaturados.

43. Os cuidados com os pacientes são influenciados positiva e negativamente pelo contexto pessoal, psicológico, emocional, religioso, educacional, financeiro, legal, institucional, científico e social. Assinale a opção CORRETA que agrupa os itens que tem a ver com aspectos contextuais:

I- Recursos médicos e de enfermagem.

II- Problemas Familiares.

III- Conflitos de interesses.

IV- Genética humana.

a) I, e IV são verdadeiras.

b) III e IV são verdadeiras.

c) I, II e III são verdadeiras.

d) Todas são verdadeiras.

44. Mulher com 48 anos de idade, sobrepeso, com alimentação inadequada, gastrite e hérnia de hiato, é acompanhada clinicamente há cerca de nove anos. Tem queixa de azia, queimação e dor retro esternal. Realizou endoscopia de controle há uma semana, que mostrou esofagite com esôfago de Barret em uma extensão de 3,5 cm. Foram colhidas biópsias cujo resultado foi metaplasia de Barret. A conduta inicial para o seguimento deste paciente é:

- a) Erradicação de *H. pylori* com amoxicilina - 2,0 g/dia e claritromicina - 1,0 g/dia.
- b) Indicação imediata de esofagectomia parcial.
- c) Indicação imediata de cirurgia antirrefluxo.
- d) Uso de inibidores de bomba de prótons de 60 a 80 mg/dia por três meses.**

45. A água pode ser veículo portador de inúmeras substâncias químicas capazes de provocar problemas graves à saúde do indivíduo que as consume. Identifique para cada componente químico as consequências que trazem para a Saúde.

Assinale a associação CORRETA:

| | |
|------------|--|
| A- Chumbo | () Irritação do Sistema Nervoso Central, vômitos, dores musculares, respiração débil. |
| B- Cádmio | () Cansaço, transtornos abdominais, irritabilidade, anemia. |
| C- Lindano | () Desordem gastrointestinal grave, Bronquite, Enfisema. |
| D- Cianeto | () Pode ser fatal em dose alta. |

- a) A-B-C-D
- b) A-D-C-B**
- c) C-B-D-A
- d) C-A-B-D.

46. Grávida de 23 anos de idade, primigesta com história de boa saúde e 35 semanas de gestação, que assiste a consulta pré-natal sem queixas. Ao exame clínico apresenta pressão arterial 140/90 (em decúbito lateral esquerdo) e FC: 86 bpm. Com altura uterina de 34 cm e dinâmica uterina de 0 em 10 minutos. Traz exame de proteinúria em 24 horas solicitada na consulta anterior de 320 mg/24 h. As anotações anteriores de PA são:

| 1ª consulta | 2ª consulta | 3ª consulta | 4ª consulta | 5ª consulta |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100/70 | 110/70 | 110/80 | 120/80 | 130/90 |

O diagnóstico CORRETO da paciente é:

- a) Iminência de Eclâmpsia.
- c) Pre- Eclâmpsia leve.**
- b) Pre- Eclâmpsia grave.
- d) Hipertensão gestacional.

47. Na unidade Básica onde presta serviço, médico acompanha paciente hipertenso de 40 anos, obeso, com PA 160/100 mmHg, triglicérides= 220(valor de referência < 150 mg/dL), HDL = 40 mg/dL (valor desejável > 60 mg/dL), glicemia = 120 mg/dL (valor de referência < 99 mg/dL), relatando dificuldade para perder peso. Na escolha da terapia medicamentosa hipotensora, qual medicamento NÃO usaria por ter efeitos metabólicos antagônicos às medidas para redução de peso e de controle da glicemia:

- a) Enalapril.
- b) Losartana.
- c) Propanolol.**
- d) Diltiazem.

48. Assinale qual afirmação, acerca de distúrbios hipertensivos na gestação é CORRETA:

- a) Hipertensão acima de 140 x 90 mmHg, sem edema e sem proteinúria, antes das 20 semanas, apresenta característica de pré-eclâmpsia grave.
- b) Hipertensão, edema e proteinúria antes das 20 semanas de gestação, apresenta características de doença hipertensiva específica da gestação.
- c) Hipertensão antes das 20 semanas de gestação com proteinúria de 24 horas com menos de 300 mg/L, apresenta característica de pré-eclâmpsia leve.
- d) Hipertensão leve ou moderada, sem edema e sem proteinúria, apresenta característica de hipertensão transitória.**

49. Idoso de 65 anos de idade, hipertenso, tabagista de 30 cigarros/dia, chega a Unidade de Saúde com história de dispneia, tosse produtiva e expectoração catarral abundante, relata que na noite anterior teve piora súbita da dispneia e aumentou a frequência da tosse. Qual das causas listadas, você consideraria como a mais frequente na piora do estado do paciente:

- a) Pneumonia por aspiração.
- b) **Infecção respiratória viral.**
- c) Pneumonia por germes oportunistas.
- d) Tromboembolia pulmonar.

50. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida por limitação crônica ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Essa limitação está associada à resposta inflamatória exagerada do pulmão à inalação de partículas e/ou gases tóxicos, sendo prevenível e tratável. Quanto ao tratamento, assinale qual das seguintes expressões é INCORRETA:

- a) O tratamento medicamentoso é utilizado para diminuir sintomas e complicações.
- b) Os broncodilatadores são as medicações centrais para o tratamento sintomático.
- c) Tratamentos regulares com broncodilatadores de longa ação não são tão eficientes quanto os de curta ação.**
- d) É consenso que o diagnóstico precoce, tratamento adequado com prevenção de exacerbações e hospitalizações podem reduzir significativamente os custos associados com a DPOC.